العلاج:

• يهدف العلاج إلى التخلص النهائي من الطفيليات المسببة للمرض، وذلك باستخدام دهانات موضعية مثل البيرميترين. يتم إجراء حمام ماء ساخن واستخدام الصابون ومن ثم يجفف الجسم بشكل جيد، ثم يدهن الجسم بالدواء.

طريقة الاستخدام بالنسبة لمحلول البيرميترين ٥٪	Kwellada lotion -%5 Permetrin
العمر	الكمية المستخدمة حسب العمر/مل
من ١ يوم حتى ٢ شهر	يجب استشارة الطبيب
من ٢ شهر حتى ١ سنة	٣,٧٥
من ١ سنة حتى ٥ سنوات	٧,٥
من ٦ سنة حتى ١٢ سنة	١٥
من ١٢ سنة وفوق	من ٣٠ إلى ٦٠

• ويفضل استخدام الدواء ليلاً قبل الذهاب للسرير وذلك بوضعه على الجسم بأكمله من الذقن حتى عقب القدم أما فروة الرأس والوجه فيجب علاجهما فقط عند الأطفال أقل من سنتين أو طريحي الفراش وبعض الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. (يحتاج المصاب إلى شخص يعاونه في دهان المناطق التي لايطولها من الجسم كالظهر وبين الكتفين).

• يترك الدواء على الجسم لمدة تتراوح بين ٨-١٤ ساعة، ومن ثم إعادة الاستحمام بالماء الدافئ (خاصة بالنسبة للأطفال الذين قد تتحسس بشرتهم من التركيز المرتفع للبيرميترين)، بالمقابل إذا ما غُسلَت اليدان قبل مضي أول ٨ ساعات من وضع الدواء فيجب إعادة وضع الدواء مرة أخرى وتركه حسب التعليمات.

• ويجب قص الأظافر وتطبيق العلاج تحت حوافها الحرة.

• عند المرأة المرضع يزال الدواء من الحلمة قبل الرضاعة ويعاد دهنها بعد ذلك.

• من الضروري علاج كل المخالطين ويجب على كل من يستخدم العلاج اتباع التعليمات المرفقة بالنشرة الدوائية بدقه.

• يمكن تكرار العلاج بعد مضي أسبوع، لكن يمنع تكراره بعد ذلك دون الاستشارة الطبية لأن الاستخدام الزائد قد يهيج الجلد.

• يجب علاج جميع أفراد الأسرة حتى وإن كان لا يوجد لديهم أي أعراض.

• يمكن استعمال مضادات الحكة والكريمات الملطفة لتقليل الحكة الجلدية التي قد تستمر لعدة أسابيع بعد القضاء على طفيلي الجرب.

مع دعائنا للجميع بالسلامة،
وللمصابين بالشفاء العاجل

هيئة الشام الإسلامية

www.islamicsham.org
contact@islamicsham.org
/ islamicsham1 / islamicsham

هيئة الشام الإسلامية

المكتب الطبي

الجرب
مشاكله وعلاجه

مقدمة:

الجرب مرض شائع تسببه سوسة صغيرة جداً يصعب رؤيتها بالعين المجردة تسمى القارمة الجربية، يصيب الأغنياء والفقراء وكل الأجناس والشعوب، ويمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية من الأطفال الرضع إلى كبار السن، يحدث الجرب في الخريف والشتاء، ويظهر العرض بعد ٤-٦ أسابيع من العدوى وفوراً عند تكرار إصابة شخص شفي سابقاً.

أهم ما يميزه ظهور الحكة الليلية والتي قد تكون جماعية بين أفراد العائلة مع وجود طفح حطاطي (ذو حبوب صغيرة ومرتفعة). وقد توجد الأنفاق على جوانب الأصابع وبينها، وهي عبارة عن مسارات خطية حفرتها سوسة الجرب في الطبقة السطحية للجلد.

الطفيليات المسببة للجرب تفضل الأماكن الدافئة من الجلد، لذلك تكون أكثر انتشارًا في ثنايا الجلد مثل الإبطين، وبين الأصابع، وحول السرة، والأرداف والمرفقين، وباطن الرسغ، وحول حلمة الثدي والأعضاء التناسلية (العضو الذكري)، وقد يشتبه الجرب مع الأكزيمة والحزاز المسطح.



في الأطفال الصغار والرضع قد يصيب أماكن غير معتادة في الجرب مثل الوجه وفروة الرأس والرقبة والأخمصين (باطن القدمين)، لذلك يجب تمييزه عن الأكزيما والسعفات.

كيف ينتشر المرض:

الجرب هو مرض معدٍ، ينتقل عادة بالملامسة الجلدية والمعاشرة الجنسية، وتنتشر العدوى بسهولة أكثر في الأماكن المزدحمة وفي الحالات التي فيها الكثير من التماس المباشر مثل: المعسكرات، السجون، المخيمات، وقد ينتقل من الحيوانات للإنسان، أو بسبب سوء العناية الصحية أو من الزحام. أو استعمال الفوط والمناشف أو أغطية الفراش أو الملابس الملوثة والخاصة بشخص مصاب.

الوقاية:

لأن الطفيلي المسبب للجرب يمكن أن يعيش (٢-٣ أيام) في اللباس، الفراش، أو الغبار فمن المحتمل أن يصاب المريض من شخص آخر مصاب يشترك معه في: السرير أو البطانيات أو الشراشف أو المناشف. فيجب أن تغسل بالماء الحار وأن تتعرض للتهوية والشمس. ويمكن أيضاً جمع الأغراض الشخصية للمصاب ووضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لمدة أسبوع.